

FERTILIZACIÓN INICIAL PARA PLANTACIONES DE PIÑEIRO MELLORADO DENTRO DUNHA SILVICULTURA A MEDIDA: AVALIACIÓN DAS DOSES DE APLICACIÓN E APROXIMACIÓN Á SÚA RENDIBILIDADE (AC2021L-3)

- O nitróxeno non é un nutriente necesario no crecemento destes piñeiros nas súas primeiras etapas de desenvolvemento.
- O fósforo si que ten un efecto positivo, sempre e cando no se abuse do seu uso, xa que non hai diferenzas entre os tratamentos que levan 20, 40 ou 60 g deste nutriente.
- O potasio, observamos que para o piñeiro do país non ten un efecto significativo no seu crecemento, aínda que podería ter un efecto positivo na súa supervivencia. Para o piñeiro insigne, o potasio si que presenta un efecto positivo tanto no crecemento como na supervivencia.
- Aconséllase que, para o piñeiro do país, se apliquen unhas doses de fertilizante con contido en fósforo de 20 g, non sendo necesario achegar potasio e preferiblemente sen nitróxeno.
- Para o piñeiro insigne recoméndase un fertilizante con 20 g de fósforo, 20 g de potasio e preferiblemente sen nitróxeno.
- O beneficio da fertilización está moi influenciado polos prezos da madeira e a taxa de desconto.
- En todos os itinerarios silvícolas estudados, é mais rendible facer unha fertilización de inicio que non fertilizar.



AXENCIA GALEGA
DA CALIDADE
ALIMENTARIA

Selvicultura de piñeiro galego

Primeiros pasos para
un bo investimento

1 Asegúrate de que o sitio de plantación é o adecuado

Verde escuro:

zona máis produtiva

Verde claro:

zona menos produtiva

• Bo chan

• Altitude < 700 m

• Clima suave

• Pendente < 35%



2 Planifica o momento de plantación

Planta no outono ou primavera, nun día nubrado,
húmido e sen vento. En piñeirais recentemente
cortados pode ser recomendable esperar antes
de replantar, ben por motivos sanitarios ou por
posibilidade de rexeneración natural).

3 Utiliza piñeiros locais de calidade

No viveiro forestal próximo ao teu terreo,
elixe piñeiros con etiqueta rosa ou azul os
que garantan boa calidade xenética.



5 Aplica unha densidade de plantación

de 1000-1250 pés/ha.



7 Controla a vexetación arbustiva

durante os primeiros anos.

4 Prepara o chan

- Rosa se o terreo presenta vexetación arbustiva.
- Realiza un subsolado lineal.



6 Abona no momento da plantación

Aplica unha dose adecuada dun fertilizante
de liberación lenta, rico en fósforo. O nitróxeno
non é un nutriente necesario nas primeiras
etapas de desenvolvemento deste piñeiro.



Organiza

Centros de desenvolvemento Forestal

LOURIZÁN



XUNTA
DE GALICIA

CONSELERÍA
DO FOLEIRO
RURAL



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural



CONSELERÍA
DO FOLEIRO
RURAL